



ΠΟΤΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΠΑΤΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ ΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Τα παιδιά με επείγοντα προβλήματα καλό είναι να μεταφέρονται στο νοσοκομείο άμεσα, καμιά φορά και πριν καν μιλήσετε με τον παιδίατρο στο τηλέφωνο.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε και να ξεχωρίζετε κάποια σημάδια που πρέπει να σας κινητοποιήσουν άμεσα.

Μια ενδεικτική λίστα τέτοιων σημείων είναι:

Ι ΠΥΡΕΤΟΣ

- ! Πυρετός $> 38^{\circ}$ σε ένα μωρό ηλικίας κάτω των 10 εβδομάδων, δηλαδή περίπου 2.5 μηνών.
- ! Πυρετός ανεξαρτήτου ηλικίας, που συνοδεύεται εξάνθημα που δεν εξαφανίζεται στην πίεση- τεστ πίεσης με διαφανές ποτήρι.



- ! Πυρετός με ρίγος και έντονη σύγχυση (το παιδί είναι νυσταλέο, νωθρό και γενικότερα δεν ανταποκρίνεται ως συνήθως).
- ! Πυρετός ανεξαρτήτου ηλικίας, έμετοι και δυσκολία να ανοίξει τα μάτια στο φως.

II ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

- ! Εξάνθημα αναφυλαξίας που επεκτείνεται γρήγορα, ειδικά εάν συνοδεύεται από κνησμό και πρήξιμο στο πρόσωπο.



- !
- ! Βήχας που έρχεται σε κρίσεις και δυσκολεύει το παιδί στο να αναπνεύσει
- ! «Σφύριγμα» που έρχεται από το στήθος
- ! Όταν το παιδί δυσκολεύεται να μιλήσει ή όταν μιλάει ή όταν γελάει ξεκινά ασταμάτητος βήχας
- ! Όταν ανασαίνει γρήγορα και κατά την αναπνοή εμφανίζονται «λακάκια» στο λαιμό και ανάμεσα στα πλευρά
- ! Όταν για να ανασάνει ανασηκώνει τα ρουθούνια
- ! Όταν ο βήχας μοιάζει με «γαύγισμα».
- ! Όταν αδυνατεί να καταπιεί τα σάλια του.

III ΠΟΝΟΣ

- ! Πονοκέφαλος που συνοδεύεται από εμετούς.
- ! Πόνος στην κοιλιά που συνοδεύεται από εμετούς.
- ! Πόνος στην κοιλιά και άρνηση του παιδιού να μετακινηθεί κατα οποιονδήποτε τρόπο.
- ! Πόνος στα γεννητικά όργανα του αγοριού.