

## ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ- Πρόληψη μετάδοσης των ιώσεων

Οι ιώσεις μεταδίδονται με διάφορους τρόπους:

- Με τις εκκρίσεις του αναπνευστικού ( μύτη, αεροσταγονίδια στο βήχα κλπ)
- Με τα χέρια (απλή επαφή)
- Από τα κόπρανα

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις στην πρόληψη της μετάδοσης συμβάλλει **το καλό πλύσιμο των χεριών** (στην οικογένεια και το περιβάλλον του βρεφονηπιακού σταθμού).

Εάν κάποιος μεγάλος στο σπίτι είναι κρυωμένος, καλά είναι εφόσον προσέχει ή φροντίζει το παιδί, να φορά μια μασκούλα στην κοντινή επαφή.



## **Πότε το παιδί δεν πρέπει να πάει στον παιδικό σταθμό- Γενικές ενδείξεις**

- ❖ Όταν αδυνατεί να παρακολουθήσει το ημερήσιο πρόγραμμα γιατί δεν αισθάνεται καλά
- ❖ Όταν το παιδί έχει ανάγκη αυξημένης φροντίδας, γιατί αν και η ασθένειά του έχει περάσει, απαιτεί ακόμη προσοχή
- ❖ Όταν το παιδί έχει διάρροια με αίμα και βλέννα. Στην περίπτωση αυτή το μικρόβιο μπορεί να είναι λοιμογόνο.

## **Άλλες περιπτώσεις που το παιδί δεν πρέπει να πάει στο σταθμό είναι**

- Όταν παρουσιάζει συμπτώματα ύποπτα για μηνιγγίτιδα.
- Όταν έχει γαστρεντερίτιδα (εμετούς & διάρροια) ή παθογόνο κολοβακτηρίδιο, επειδή έχουν μεγάλη μεταδοτικότητα.
- Όταν πάσχει από ερπητική στοματίτιδα, γιατί μεταδίδεται άμεσα με τις εκκρίσεις.
- Όταν έχει ηπατίτιδα Α.
- Σε περίπτωση πυώδους αμυγδαλίτιδας, μολυσματικού κυρίου και οστρακιάς, το παιδί μπορεί να επιστρέψει 48 ώρες μετά την έναρξη της θεραπείας με αντιβιοτικό
- Σε περίπτωση ιλαράς, ερυθράς, παρωτίτιδας ανεμευλογιάς και κοκκύτη, συμβουλευτείτε τον παιδίατρο για το χρόνο που μπορεί το παιδί να επανέλθει στο σχολείο.